

## 供血動物健康基準

【供血犬】須符合下列條件，始得供血：

- 一、 年齡：1歲以上，8歲以下，健康情況良好。
- 二、 體重：18公斤以上。
- 三、 體溫：肛溫不超過攝氏39.5度。
- 四、 預防接種：每年定期接受狂犬病和多價疫苗接種。
- 五、 若曾服用藥物，則需事先告知獸醫師以進行評估。
- 六、 未曾接受過血液或血液成分製品輸血。
- 七、 未曾接受過細胞或組織產品（例如幹細胞）治療的動物。曾接受自體幹細胞治療的動物不在此限。
- 八、 未曾患惡性腫瘤。
- 九、 懷孕中之母犬應暫緩供血。過去曾懷孕之母犬不在此限。
- 十、 每年經獸醫師進行基本理學檢查。
- 十一、 實驗室評估：
  - （一）每年進行血液學檢查。
  - （二）每年進行血清/血漿生化學檢查。
  - （三）每年進行血液媒介性病原篩檢：
    - Dirofilaria immitis* –抗原陰性
    - Anaplasma platys* – PCR陰性
    - Babesia (canis) vogeli* –PCR陰性
    - Babesia gibsoni* –PCR陰性
    - Ehrlichia canis* –PCR陰性
  - （四）血型鑑定。
- 十三、每次供血前檢測血容比(PCV)至少40%、血紅素(Hb)至少13 g/dL。
- 十四、每次供血量上限為18 mL/kg，如當次抽血量超過10 mL/kg，動物至少休息4週。未達10 mL/kg者，供血間隔不得低於2週。
- 十五、經動物的所有者書面同意，包括鎮靜/麻醉同意書（如有需要）。

## 供血動物健康基準

【供血貓】須符合下列條件，始得供血：

- 一、 年齡：1歲以上，8歲以下，健康情況良好。
- 二、 體重：3.7公斤以上。
- 三、 體溫：肛溫不超過攝氏39.5度。
- 四、 預防接種：每年定期接受狂犬病和多價疫苗接種。
- 五、 若曾服用藥物，則需事先告知獸醫師以進行評估。
- 六、 未曾接受過血液或血液成分製品輸血。
- 七、 未曾接受過細胞或組織產品（例如幹細胞）治療的動物。曾接受自體幹細胞治療的動物不在此限。
- 八、 未曾患惡性腫瘤。
- 九、 懷孕中之母貓應暫緩供血。過去曾懷孕之母貓不在此限。
- 十、 每年經獸醫師進行基本理學檢查。
- 十一、 實驗室評估：
  - (一) 每年進行血液學檢查。
  - (二) 每年進行血清/血漿生化學檢查。
  - (三) 每年進行血液媒介性病原篩檢：
    - Dirofilaria immitis* –抗原陰性
    - Feline immunodeficiency virus* –抗體陰性
    - Feline leukemia virus* –抗原陰性
    - Bartonella henselae* –PCR陰性
    - Mycoplasma haemofelis* –PCR陰性
  - (四) 血型鑑定。
- 十三、 每次供血前檢測血容比(PCV)至少30%、血紅素(Hb)至少10 g/dL。
- 十四、 每次供血量上限為15 mL/kg，如當次抽血量達體重上限，動物至少休息3週。
- 十五、 經動物的所有者書面同意，包括鎮靜/麻醉同意書（如有需要）。